



Groupe musculaire postérieur				
Sub-scapulaire	Fosse sub-scapulaire (face ant)	Tendon sur tubercule mineur	Nerfs sub-scapulaires inf et sup (racines C5, C6, C7)	Rotateur médial de l'humérus + ligament actif de l'articulation scapulo-humérale
Supra-épineux	Fosse sus-épineuse de la scapula (3/4 int)	Sommet. du tubercule majeur. Trajet sous ligt acromio-coracoïdien (possibilité de conflit)	Nerf supra-scapulaire issu du tronc supérieur du plexus brachial (racines C5, C6).	Starter abduction épaule. Synergique du deltoïde. Si rupture >>> impossibilité de ce mvmt. Rotateur externe. Ligament actif de art scap-hum.
Infra-épineux	Fosse sous-épineuse de la scapula	Tubercule majeur face post. Trajet passe en arrière de artic. scap-hum.	Nerf supra-scapulaire issu du tronc supérieur du plexus brachial (racines C5, C6).	Rotateur externe. Ligament actif de art scap-hum.
Grand rond	Fosse infra-épineuse, le long de la moitié inf. du bord latéral	Gouttière bicipitale	Nerf sub-scapulaire inf (racines C5, C7)	Adducteur et rotateur médial du bras
Petit rond	Fosse infra-épineuse, le long de la moitié sup. du bord axillaire de scapula	Tubercule majeur (tendon)	Nerf axillaire (C5-C6)	Idem infra-épineux
Grand dorsal (lame triangulaire)	Aponévrose de th7 au coccyx compris (crête sacrée, vertèbres lombaires), 1/3 post crête iliaque. >>> subit une torsion.	Fond de la gouttière bicipitale.	Nerf thoraco-dorsal (C6, C7, C8)	Adducteur, fléchisseur et rotateur int du bras, muscle du grimper avec le grand pectoral

